

طاقة الوضع الثقالية والطاقة الميكانيكية

التمرين 1 : الحالة المرجعية لطاقة الوضع الثقالية

من فوق قنطرة توجد على ارتفاع $H = 2m$ من سطح نهر ، يرسل أسامة رأسيا نحو الأعلى ومن نقطة A ، كرة كتلتها $m = 70g$ ، تصل إلى نقطة B توجد على ارتفاع $h = 5m$ من النقطة A . توجد النقطة A على ارتفاع $h_0 = 0,5m$ من سطح القنطرة . نعتبر المحور (\bar{k}) رأسيا وموجها نحو الأعلى بحيث يطابق O نقطة الإرسال A .

- أحسب طاقة الوضع الثقالية للكرة عند بلوغها الارتفاع الأقصى في الحالات المرجعية التالية :


A - المستوى المار من نقطة الإرسال A

B - المستوى المار من سطح الماء للنهر

2 - أكتب تعبير طاقة الوضع الثقالية للكرة في نقطة M أنسوبيها z_M بالنسبة لنقطة الإرسال A في الحالتين A و B

التمرين 2 تغير طاقة الوضع الثقالية

في حديقة الأطفال تتحرك عربة صغيرة كتلتها $m = 65kg$ على سكة ABCDE ذي الشكل الممثل أسفله . توجد السكة في مستوى راسي .



مختلف مواضع النقط A و B و C و D و E متعلقة بالمستوى الأرض حيث توجد على ارتفاعات التالية بالنسبة لسطح الأرض : $h_A = 20m$; $h_B = 10m$; $h_C = 15m$; $h_D = 5m$; $h_E = 18m$

- 1 - أحسب تغير طاقة الوضع الثقالية عند مرور العربة من A إلى B و من B إلى C و من C إلى D و من D إلى E
- 2 - أحسب طاقة الوضع الثقالية في النقطة D باختيار حالة مرجعية ملائمة .

التمرين 3 : تعبير طاقة الوضع الثقالية لقضيب قابل للدوران حول محور ثابت

نعتبر قضيبا O'A كتلته $O'A = \ell = 40cm$ وطوله $m = 0,5kg$ يدور في مستوى راسي حول محور (Δ) أفقي ومار من أحد طرفيه O' (انظر الشكل)

1 - أوحد تعبير طاقة الوضع الثقالية E_{pp} للقضيب بدلالة الزاوية θ التي يكونها القضيب مع الخط الرأسي المار من (O) والكتلة (Δ) والكتلة ℓ و g شدة مجال الثقالة .

نختار المحور (\bar{k}) الموجه نحو الأعلى والمطابق للحالة التي يكون فيها القطب في توازن مستقر حيث O متطابقة مع مركز قصورة . والمستوى المار من مركز قصورة

كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية $E_{pp} = 0$

2 - أحسب تغير طاقة الوضع الثقالية عندما تمر θ من 20° إلى 60° .

3 - استنتج قيمة شغل وزن الجسم خلال هذا الانتقال .

التمرين 4 : مخطط الطاقة

ن Duffy حجرة كتلتها $m = 50g$ من سطح الأرض بسرعة $v = 72km/h = 20m/s$ نحو الأعلى . نختار حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية سطح الأرض .

1 - مثل على نفس المخطط $E_{pp} = f(z)$ و $E_m = g(z)$ و استنتاج E_C بدلالة z

2 - حدد الارتفاع h في الحالتين التاليتين :

- طاقتها الحركية مساوية لطاقة الوضع الثقالية .

- طاقتها الوضع الثقالية مساوية للطاقة الحركية البدئية .

التمرين 5 تعبير الطاقة الميكانيكية

تسقط كرية من الرصاص كتلتها $m = 50g$ بدون سرعة بدئية من ارتفاع $h = 2m$ من سطح الأرض . نأخذ سطح الأرض مرجعاً لطاقة الوضع الثقالية في مجال الثقالة ونوجه المحور (\bar{k}) مركزه ينتمي إلى سطح الأرض

طاقة الوضع الثقالية والطاقة الميكانيكية

- 1 - أعط تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة { أرض - كرية }
- 2 - أحسب قيمة الطاقة الميكانيكية للمجموعة عند بداية سقوط الكرية .
- 3 - بإهمال تأثير الهواء خلال السقوط ، ما هي الميزة الفيزيائية الخاصة لهذه المجموعة ؟
- 4 - أحسب قيمة الطاقة الميكانيكية للمجموعة عندما تصل الكرية إلى نقطة يوجد على ارتفاع 1,8m من سطح الأرض .
- 4 - أحسب الطاقة الحركية للكرية لحظة سقوطها على سطح الأرض واستنتج سرعتها .

تمرين 6 الدراسة الميكانيكية لحركة جسم على سطح مائل

نزل جسم صلبا (S) كتلته $M=0,5\text{kg}$ فوق مستوى مائل بسرعة بدئية $v_0=5\text{m/s}$

- 1 - ما قيمة الطاقة الميكانيكية للجسم (S) لحظة انطلاقه إذا اخترنا كمرجع لطاقة الوضع الثقالية المستوى الذي ينتمي إليه موضع انطلاق الجسم ؟

- 2 - علما أن زاوية الميل للمستوى بالنسبة للخط الأفقي هي $\alpha=10^\circ$ وأن القوة \vec{R} المطبقة على الجسم من طرف المستوى المائل لها المميزات التالية :

$$R=4,98\text{N}$$

- الشدة المعنوي معاكس لمنحنى حركة الجسم (S) .

- الاتجاه يكون زاوية $\varphi=14^\circ$ مع الخط المتعامد مع المستوى المائل .

- 2 - 1 بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية ، أحسب المسافة ℓ التي يقطعها الجسم (S) فوق المستوى المائل لكي تأخذ سرعته القيمة $v_0/2$.

- 2 - 2 أحسب ، في هذه الحالة ، الطاقة الميكانيكية للجسم (S) . ماذا تستنتج ؟

تمرين 7

نعتبر جسمًا صغيرا كتلته m ينتقل فوق مدار $ABCD$ يتكون من جزء مستقيم طوله $\ell = AB$ ، ومن جزء دائري \mathcal{C} شعاعه r نطلق الجسم (S) من النقطة A بدون سرعة بدئية .

نأخذ حالة مرجة لطاقة الوضع الثقالية المستوى الأفقي (π) .

1 - نعتبر الاحتكاكات مهملة .

1 - 1 أوجد تعبير طاقة الوضع الثقالية للجسم S .

1 - 2 أوجد تعبير الطاقة الميكانيكية للجسم (S) في الموضع

$$A \text{ بدلالة } m \text{ و } g .$$

1 - 3 بين أنه لكي يتمكن الجسم من عبور محيط الدائرة كله يجب أن تكون $h \geq 2r$

$$m = 0,5\text{kg} \text{ و } r = 0,5\text{m} \text{ و } AB = 2\text{m}$$

$$\text{و } \theta = 60^\circ \text{ و } g = 10\text{N/kg}$$

أ - هل سيغادر الجسم النقطة D ؟


ب - أحسب الطاقة الميكانيكية في الموضع A .

ج - ما هي قيمة الطاقة الميكانيكية في الموضع التالي B و C و D ؟ استنتاج قيمة سرعة الجسم (S)

في الموضع B و في الموضع D .

2 - في الواقع سرعة الجسم S في الموضع B

$$\text{تساوي } 4,00\text{m/s}$$



نتيجة قوى الاحتكاك المطبقة على الجسم في الجزء AB التي نعتبرها مكافئة لقوة \vec{f} ثابتة ومنحاها معاكس لمنحنى حركة الجسم S .

2 - 1 أحسب الطاقة المفقودة على شكل حرارة أثناء الانتقال AB

2 - 2 أحسب شدة القوة \vec{f} .

طاقة الوضع الثقالية والطاقة الميكانيكية

التمرين 8

نعبر المجموعة الميكانيكية التالية والمكونة من متجركين A و B لهما نفس الكتلة $m_A = m_B = 2\text{kg}$ ، موضوعين فوق

مستويين مائلين ومرتبطين ببكرة بواسطة جبل غير قابل الامتداد و ذي كتلة مهملة . كتلة البكرة مهملة . انظر الشكل

- في الحالة البدئية توجد المجموعة في وضعية حيث $z_A - z_B = 0,5\text{m}$ الحالة منعدمة . أحسب طاقة الوضع الثقالية للجسم A في هذه

- نطلق المجموعة فتحرك في المنحى من A نحو B أوجد تعبير السرعة لكل من الجسمين A و B عندما ينتقلا بمسافة ℓ على المستوى المائل . أحسب هذه السرعة نعطي $\ell = 20\text{cm}$ و $\beta = 30^\circ$ و $\alpha = 60^\circ$.

التمرين 9

يمكن لجسم صلب (S) كتلته $M = 0,4\text{kg}$ أن ينزلق فوق سكة ABC توجد في مستوى رأسي (انظر الشكل) . تكون هذه السكة من :

- جزء AB طوله $AB = \ell = 1,2\text{m}$ مائل بزاوية $\alpha = 30^\circ$

بالنسبة للمستوى الأفقي حيث التماس يتم بدون احتكاك .

- جزء BC مستقيم وأفقي حيث التماس يتم باحتكاك . في اللحظة $t_0 = 0$ نرسل الجسم (S) من النقطة A

بسرعة بدئية $v_A = 2\text{m/s}$ ، ليمر من النقطة B في اللحظة t_1 بسرعة v_B . نعتبر المستوى الأفقي المار من B و C مراعاً لطاقة الوضع الثقالية .

- أحسب شغل وزن الجسم (S) أثناء انتقاله على الجزء AB . نأخذ $g = 10\text{N/kg}$

- بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين اللحظتين t_0 و t_1 أوجد قيمة السرعة v_B

- أحسب $E_m(A)$ و $E_m(B)$ قيمي الطاقة الميكانيكية للجسم (S) في الموضعين A و B .

- أحسب تغير الطاقة الميكانيكية ΔE_m بين اللحظتين t_0 و t_1 . ماذًا تستنتج ؟

- بعد مرور الجسم من النقطة B بسرعة v_B يتبع الجسم حرکته على المستوى الأفقي BC حيث الاحتکاكات مكافئة لقوية أفقية f شدتها $f = 2\text{N}$ ثابتة .

أوجد قيمة المسافة BC علماً أن الجسم (S) يتوقف عند النقطة C .

- بأية سرعة v يجب إرسال الجسم من C ليصل إلى النقطة A بسرعة منعدمة ؟ باعتبار أن التماس في الجزء AB يتم بدون احتكاك وفي الجزء BC يتم باحتكاك وشدة قوة الاحتکاك $f = 2\text{N}$ ثابتة وأفقية .

التمرين 10

يتكون نواس وازن من عارضة متاجسة OA طولها $\ell = 50\text{cm}$ وكتلتها مهملة وجسم نقطي مثبت في طرفها A كتلته $m = 200\text{g}$. نعتبر الاحتکاكات مهملة ونأخذ $g = 10\text{N/kg}$

نزير النواس عن موضع توازنه المستقر بزاوية $\alpha_0 = 30^\circ$ ونطلقه بسرعة بدئية v_0 عمودية على المستقيم (OA) .

- أوحد القيمة الدونية v_0 لكي يتمكن النواس الوازن من إنجاز دورة كاملة حول O .

- علماً أن النواس انطلق بسرعة بدئية $v_0 = 4,5\text{m/s}$ حدد القيم الدونية والقصوية لسرعة الجسم ولطاقته الحركية .

التمرين 11

نماثل حلقة بمحيط دائرة وازن مركزه C وشعاعه $R = 0,45\text{m}$ وكتلة $m = 250\text{g}$ يمكن للحلقة أن تذبذب حول محور (Δ) أفقى .


يمر من نقطة O من محيط الدائرة .

طاقة الوضع الثقالية والطاقة الميكانيكية

- 1 - نزح الحلقة عن موضع التوازن المستقر بزاوية $\theta_0 = 30^\circ$ ونطلقها بدون سرعة بدئية .
 - 1 - أوجد تعبير طاقة الوضع الثقالية للحلقة بدلالة الزاوية θ التي تكونها OC مع الخط الرأسي المتطابق و موضع التوازن المستقر و m و R . ونأخذ حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية موضع التوازن المستقر للحلقة. نأخذ $g = 10N/kg$
 - 1 - باعتمادك على دراسة الطاقة الميكانيكية ، أوجد تعبير الطاقة الحركية للحلقة عندما تكون OC زاوية θ مع الخط الرأسي المتطابق و موضع التوازن المستقر بدلالة $m, g, R, \theta_0, \theta$.
 - 1 - أحسب القيمة القصوى للطاقة الحركية .
 - 2 - نزح الحلقة عن موضع توازتها بالزاوية $\theta_0 = 30^\circ$ ونطلقها .
- أوجد الطاقة الحركية الدونية التي يجب إعطاؤها للحلقة لكي تتمكن من إنجاز دورة كاملة ؟

التمرين 12

نعتبر المجموعة الميكانيكية التالية : AB عارضة كتلتها ممولة . في طرفي العارضة A و B ثيتا جسمين يمكن اعتبارهما نقطتين



يمكن لعارضة AB أن تدور حول محور Δ يمر من وسطها O .
كتلتاهما على التوالي هي $m_1 = 200g$ و $m_2 = 100g$.
 $OA = OB = 30\text{cm}$

- 1 - بين أن التوازن الأفقي للمجموعة غير ممكن .
- 2 - العارضة في الحالة البدئية أفقية ، نطلقها بدون سرعة بدئية .
أحسب سرعتي الجسمين الم موضوعين في A و B عند دورة العارضة بزاوية $\alpha = 45^\circ$ استنتاج السرعة الزاوية للعارضه .
- 3 - ما هي السرعة القصوى للجسمين خلال حركة المجموعة ؟

التمرين 13

نعتبر سكة لها شكل ربع دائرة شعاعها $r = 2m$ و مركزها O توجد في مستوى رأسي كما يبين الشكل جانبها نحرر عند النقطة A جسمًا صلبا (S) نقطيا كتلته $m = 750g$ بدون سرعة بدئية. فينزلق طول السكة . نأخذ $g = 10N/kg$

- 1 - أحسب شغل وزن الجسم خلال انتقاله من A إلى B
- 2 - نأخذ المستوى الأفقي المار من النقطة B كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية :

2 - 1 بين أن الطاقة الميكانيكية ل (S) عند النقطة M انسوبها تكتب على الشكل التالي .
 $E_m = mg(z+r) + \frac{1}{2}mv^2$

- 2 - 2 أحسب قيمتها عند النقطة A .

3 - علما أن الاحتاكات بين (S) والسكة مكافئة لقوة \vec{f} شدتها ثابتة ومماسة للمسار .

2 - 3 أوجد بطريقتين (مبرهنة الطاقة الحركية و تغير الطاقة الميكانيكية) تعبير v_B سرعة (S) عند النقطة B بدلالة

$$f = 3N \quad \text{و} \quad g \quad \text{و} \quad m . \quad \text{أحسب قيمتها علما أن}$$

